

CHAPITRE 4 PROTECTION ET SANTE DES ENFANTS CONFIES	FICHE IV-6
EVICIONS SCOLAIRES ET MALADIES CONTAGIEUSES	
Guide élaboré par le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France et révision des conduites à tenir en cas de maladies transmissibles dans une collectivité d'enfants (Séance du 14 mars 2003)	Guide 2003 www.sante.gouv.fr

PRINCIPES

Pour éviter la transmission des maladies contagieuses des mesures sont parfois nécessaires pour protéger les sujets en contact à l'école.

Les durées et conditions d'éviction évoluent avec les progrès des traitements et de prévention.

Des mesures de prophylaxie (traitement préventif) des sujets en contact sont prises sur l'initiative de l'autorité sanitaire pour certaines maladies comme la méningite.

2 - RÉGLEMENTATION

MALADIE	MALADES : EVICTIONS	SUJETS AU CONTACT
Coqueluche	Oui, 5 jours	- Pas d'éviction - Dans tous les cas, contacter le médecin scolaire pour la mise en place en collectivité des mesures de prévention adaptées
Diphthérie	Oui, jusqu'à ce que les deux prélèvements rhino-pharyngés pratiqués à huit jours d'intervalle soient négatifs	Pas d'éviction : - Pour les sujets vaccinés : 1 injection de rappel - Pour les sujets non vaccinés : - mise en route immédiate de la vaccination - prélèvements de gorge - antibiothérapie pendant 7 jours en cas de prélèvement positif
Dysenterie amibienne ou bacillaire	Oui, jusqu'à guérison clinique	Pas d'éviction
Gale	Oui, jusqu'à 3 jours après traitement	- Pas d'éviction - Lavage des draps, serviettes, vêtements en machine - Informer la collectivité
Hépatite A	Oui, 10 jours après le début de l'ictère (jaunisse)	- Pas d'éviction - Informer la collectivité
Impétigo (et autres pyodermites)	- Non, si les lésions peuvent être protégées - Oui, dans les autres cas et pendant 72 h après le début de l'antibiothérapie	Pas d'éviction
Infection à streptocoque A (scarlatine)	Oui, jusqu'à 2 jours après le début de l'antibiothérapie	Pas d'éviction
Infection par VIH (virus du sida) ou virus de l'hépatite B	Pas d'éviction	Respecter les procédures habituelles de soin en présence de sang.
Méningite à méningocoque	Oui, jusqu'à la guérison clinique	- Pas d'éviction - La fermeture de l'établissement est inutile - Prophylaxie médicamenteuse et, en cas de méningite du groupe A ou C, vaccination chez les sujets ayant un contact fréquent avec le malade, la famille, voisins de dortoir, camarades habituels, voisins de classe, éventuellement toute la classe.

Oreillons	Oui, 9 jours après le début de la maladie (parotidite)	- Pas d'éviction - Informer la collectivité - Recommander aux sujets en contact non vaccinés de consulter leur médecin pour une vaccination éventuelle
Pédiculose	Pas d'éviction si traitement	- Informer la collectivité
Polioomyélite	Oui, jusqu'à absence de virus dans les selles	Vaccination ou revaccination systématique de tous les élèves et de tout le personnel de l'établissement, prélèvement de selles sur l'initiative de l'autorité sanitaire
Rougeole	Oui, pendant 5 jours à partir du début de l'éruption	- Pas d'éviction - Informer la collectivité - Recommander aux sujets en contact non vaccinés de consulter leur médecin dans les 72h après le contact pour une vaccination préventive.
Rubéole	Pas d'éviction	Dès qu'un cas de rubéole se déclenche, les femmes en âge de procréer doivent en être informées. En ce qui concerne les femmes enceintes, une autorisation d'absence ne pouvant excéder le début du 4 ^{ème} mois de la grossesse est alors accordée sur leur demande aux femmes présentant un test sérologique négatif de la rubéole.
Syndrome grippal épidémique	Oui, jusqu'à guérison clinique	Pas d'éviction
Teignes	Oui, jusqu'à présentation d'un certificat médical attestant d'une consultation et de la prescription d'un traitement adapté.	Examen systématique du cuir chevelu pour les enfants de la classe et les personnels en contact.
Tuberculose respiratoire	Oui, jusqu'à présentation d'un certificat médical attestant la négativité de l'expectoration	- Pas d'éviction - Dépistage chez les enfants de la classe et les personnels ayant eu un contact avec le malade.
Varicelle	Non, cependant la fréquentation scolaire à la phase aiguë de la maladie n'est pas souhaitable	Pas d'éviction